レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-1013**

レジメン名：**biweekly R-THP-COP**　　承 認 日：**2008/04/01**

1コース：　**14** 日間　　標準コース数：　　**1**　　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	点滴静注 - メイン															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓													
	速度：全開で															
2	点滴静注 - メイン															
	リツキサン注	375 mg/㎡	↓													
	生理食塩液 500mL	500 mL/body	↓													
	※　初回：25mL/hから開始。1時間毎に100mL/h、200mL															
	/hに増量。															
	※　2回目以降：問題なければ100mL/hから開始。1時間															
	後200mL/hに増量。															
3	点滴静注 - メイン															
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body		↓												
	速度：全開で															
4	点滴静注 - メイン															
	オンコビン注 1mg	1 mg/㎡		↓												
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		↓												
	速度：全開で															
	オンコビン上限値：2mg															
5	点滴静注 - メイン															
	ピノルビン注	30 mg/㎡		↓												
	5%ブドウ糖注 100mL　●	100 mL/body		↓												
	時間：30分															

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-1013**

レジメン名：**biweekly R-THP-COP**　　承 認 日：**2008/04/01**

1コース：　**14** 日間　　標準コース数：　　**1**　　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
6	点滴静注 - メイン																												
	エンドキサン注	500 mg/㎡		↓																									
	生理食塩液 500mL	1 本/body		↓																									
	時間：2時間																												
	エンドキサン上限値：750mg/㎡																												
7	点滴静注 - メイン																												
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓	↓																									
	速度：全開で																												

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(抗がん剤)：
プレドニン　60mg/㎡　内服　day1-5　適宜増減

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
カロナール　400mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
レスタミン　30mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
(2016.10.3変更)

その他：
2017/9/22　リツキサンの前に生食50ml前回投与を追加