レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-1026**

レジメン名：**Hyper-CVAD**　　承 認 日：**2012/06/22**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	点滴静注 - メイン																													
	ウロミテキサン注 400mg/4mL ●	600 mg/㎡	↓	↓	↓																									
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓	↓	↓																									
	時間：24時間																													
	ウロミテキサンはエンドキサン1日量と同量																													
2	点滴静注 - 側管																													
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body	↓	↓	↓																									
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	5 V/body	↓	↓	↓																									
	時間：15分																													
	側管1																													
3	点滴静注 - 側管																													
	エンドキサン注	300 mg/㎡	↓	↓	↓																									
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓	↓	↓																									
	時間：3時間																													
	終了後クランプ(ウロミテキサン終了後、メインルート																													
	につながったまま廃棄)																													
	側管1																													
4	点滴静注 - 側管																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓	↓	↓																									
	速度：全開で																													
	側管2																													

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：B-1026

レジメン名：Hyper-CVAD　　承 認 日：2012/06/22

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
5	点滴静注 - 側管																													
	エンドキサン注	300 mg/㎡	↓	↓	↓																									
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓	↓	↓																									
	時間：3時間																													
	終了後クランプ(ウロミテキサン終了後、メインルート																													
	につながったまま廃棄)																													
	側管2																													
6	点滴静注 - メイン																													
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body				↓							↓																	
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	5 Ｖ/body				↓							↓																	
	時間：15分																													
7	点滴静注 - メイン																													
	オンコビン注	1.4 mg/㎡				↓							↓																	
	生理食塩液注 50mL	1 本/body				↓							↓																	
	速度：全開で																													
	オンコビン上限値：2mg/body																													
8	点滴静注 - メイン																													
	ドキソルビシン塩酸塩注	50 mg/㎡				↓																								
	生理食塩液注 100mL	1 本/body				↓																								
	時間：2時間																													
9	点滴静注 - 側管																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body				↓							↓																	
	速度：全開で																													

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-1026**

レジメン名：**Hyper-CVAD**　　承 認 日：**2012/06/22**

１コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
10	点滴静注 - メイン																													
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	5 Ｖ/body												↓	↓	↓														
	生理食塩液注 100mL	1 本/body												↓	↓	↓														
	時間：15分																													

投与時の注意：
側管１、側管２は投与終了しても外さない。（メインルートにつながったまま廃棄）
ウロミテキサンはエンドキサン1日量と同量

EBM：
J Clin Oncol 2005;23:7013-7023

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
カロナール　600mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
レスタミン　50mg　p.o.　リツキサン点滴30分前