レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：B-1027

レジメン名：R-Hyper-CVAD　　承 認 日：2012/06/22

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	点滴静注 － メイン																						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																				
	速度：全開で																						
2	点滴静注 － メイン																						
	リツキサン注	375 mg/㎡	↓																				
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓																				
	初回：25mL/hから開始。1時間毎に100mL/h、200mL/hに																						
	増量。																						
	2回目以降：問題なければ100mL/hから開始。1時間後20																						
	0mL/hに増量。																						
3	点滴静注 － メイン																						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																				
	プライミング用（最初にルート内を満たすために使用																						
	する）																						
4	点滴静注 － メイン																						
	ウロミテキサン注 400mg/4mL ●	600 mg/㎡		↓	↓	↓																	
	生理食塩液 500mL	1 本/body		↓	↓	↓																	
	時間：24時間																						
	ウロミテキサンはエンドキサン1日量と同量																						

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**

申請医師:
コード：B-1027
承 認 日：2012/06/22

レジメン名：R-Hyper-CVAD

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	点滴静注 － 側管																						
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body		↓	↓	↓																	
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	5 V/body		↓	↓	↓																	
	時間：15分																						
	側管1																						
6	点滴静注 － 側管																						
	エンドキサン注	300 mg/㎡		↓	↓	↓																	
	生理食塩液 500mL	1 本/body		↓	↓	↓																	
	時間：3時間																						
	終了後クランプ(ウロミテキサン終了後、メインルート																						
	につながったまま廃棄)																						
	側管1																						
7	点滴静注 － 側管																						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		↓	↓	↓																	
	速度：全開で																						
	側管2																						
8	点滴静注 － 側管																						
	エンドキサン注	300 mg/㎡		↓	↓	↓																	
	生理食塩液 500mL	1 本/body		↓	↓	↓																	
	時間：3時間																						
	終了後クランプ(ウロミテキサン終了後、メインルート																						
	につながったまま廃棄)																						
	側管2																						

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：B-1027

レジメン名：R-Hyper-CVAD　　承 認 日：2012/06/22

１コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	点滴静注 － メイン																						
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body					↓							↓									
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	5 Ｖ/body					↓							↓									
	時間：15分																						
10	点滴静注 － メイン																						
	オンコビン注	1.4 mg/㎡					↓							↓									
	生理食塩液注 50mL	1 本/body					↓							↓									
	速度：全開で																						
	オンコビン上限値：2mg/body																						
11	点滴静注 － メイン																						
	ドキソルビシン塩酸塩注	50 mg/㎡					↓																
	生理食塩液注 100mL	1 本/body					↓																
	時間：2時間																						
12	点滴静注 － 側管																						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓				↓							↓									
	速度：全開で																						
13	点滴静注 － メイン																						
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	5 Ｖ/body													↓	↓	↓						
	生理食塩液注 100mL	1 本/body													↓	↓	↓						
	時間：15分																						

投与時の注意：
　側管１、側管２は投与終了しても外さない。（メインルートにつながったまま廃棄）
　ウロミテキサンはエンドキサン1日量と同量

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**

申請医師:
コード：B-1027
承 認 日：2012/06/22

レジメン名：R-Hyper-CVAD

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

EBM：
J Clin Oncol 2005;23:7013-7023

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
カロナール　400mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
レスタミン　30mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
(2016.10.3変更)