レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-1040**

レジメン名：**Pola-R-CHP**　　承 認 日：**2022/09/20**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	リツキサン注	375 mg/㎡	↓																											
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓																											
	※　初回：25ml/hから開始。1時間毎に100ml/h、200ml																													
	/hに増量。																													
	※　2回目以降：問題なければ100ml/hから開始、1時間																													
	後200ml/hに増量。																													
3	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													
4	点滴静注 - メイン																													
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body		↓																										
	速度：全開で																													
5	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		↓																										
	時間：30分																													

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-1040**

レジメン名：**Pola-R-CHP**　　承 認 日：**2022/09/20**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
6	点滴静注 - メイン																													
	ポライビー点滴静注用(30mg,140mg)	1.8 mg/kg		↓																										
	生理食塩液注 100mL	1 本/body		↓																										
	時間：90分																													
	1Vあたり注射用水(30mg:1.8ml、140mg:7.2ml)で溶解。																													
	20mg/mlの濃度となる。																													
	初回は90分で投与、問題なければ2回目以降30分で投与																													
	。																													
	投与時フィルターを使用してください。																													
	体重40kg未満の場合、生食を50mlに変更。																													
7	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		↓																										
	時間：30分																													
8	点滴静注 - メイン																													
	ドキソルビシン塩酸塩注	50 mg/㎡		↓																										
	生理食塩液注 100mL	1 本/body		↓																										
	時間：30分																													
9	点滴静注 - メイン																													
	エンドキサン注	750 mg/㎡		↓																										
	生理食塩液 250mL	1 本/body		↓																										
	時間：2時間																													

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-1040**

レジメン名：**Pola-R-CHP**　　承 認 日：**2022/09/20**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
10	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		↓																										
	速度：全開で																													

投与時の注意：
6サイクルまで投与可能。7,8コース目はリツキシマブ単剤投与。
※状況に応じてG-CSF製剤の一次予防的投与を検討する。

EBM：
Tilly H, et al:Polatuzumab Vedotin in Previously
Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma.
N Engl J Med. 2022,386(4):351-363

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(抗がん剤)：
プレドニン錠　60mg/㎡　内服　day1-5　適宜増減

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
Day1
アセトアミノフェン400mg　レスタミン30mg　リツキサン点滴30分前
Day2
アセトアミノフェン400mg　レスタミン30mg　Rp4開始と同時に