# レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**急性骨髄性白血病**　　申請医師:

コード：**B-3004**

レジメン名：**MA**　　承 認 日：**2011/01/28**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

| Rp | 処方 | DOSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点滴静注 - 側管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL | 1 Bag/body | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 速度：全開で | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キロサイドと同時に開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 - 側管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノバントロン注 | 7 mg/㎡ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 100mL | 1 本/body | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グラニセトロン終了後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キロサイド注 | 80 mg/㎡ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 500mL | 1 本/body | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：24時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 50mL | 1 本/body | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 速度：全開で | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与時の注意：
年齢70歳以上の場合、MIT 5mg/㎡に減量

その他：
高齢者(65歳以上)AML地固め療法第1コース