

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：その他(血液内科)

申請医師：

コード：B-5065

レジメン名：【皮下注】D-CyBorD療法【7コース目以降】

承認日：2023/11/02

1コース：28日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	皮下注射 - なし																													
	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	↓																											
	チューブ付き翼状針使用し約3-5分かけて投与。																													
	20mLシリンジに全量(15ml+α)採取。*チューブ内の口																													
	ス分を補うため																													
	シリンジで交付																													

投与時の注意：

デキサメタゾン70歳超、低体重 (BMI ≤ 18.5kg/m²)、循環血液量過多 (心不全を含む)、コントロール不良の糖尿病、過去のステロイド療法不耐の場合、day2, 9, 16, 23のデキサメタゾン20mg/bodyを省略し、20mg/weekへの減量可能。

EBM：

Palladini G, Kastritis E, Maurer MS, et. al.
 Daratumumab plus CyBorD for patients with newly diagnosed AL amyloidosis: safety run-in results of ANDROMEDA. Blood. 2020;136:71-80
 NCCNガイドライン2022
 ダラキューロ適正使用ガイド

レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：

・デキサメタゾンp. o. 20mg/day Day1 ダラキューロ投与1時間前に服用

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アセトアミノフェン400mg, レスタミン30mg p. o. Day1
 (デキサメタゾン錠と同時に服用)
 (ダラキューロ投与1時間前に服用)