レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-6014**

レジメン名：**DA-EPOCH-R（レベル3）**　　承 認 日：**2023/02/03**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	リツキサン注	375 mg/㎡	↓																											
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓																											
	※　初回：25mL/hから開始。1時間毎に100mL/h、200mL																													
	/hに増量。																													
	※　2回目以降：問題なければ100mL/hから開始。1時間																													
	後200mL/hに増量。																													
3	点滴静注 - メイン																													
	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50ml「ﾀｲﾎｳ	1 袋/body	↓																											
	速度：全開で																													
4	点滴静注 - メイン																													
	エトポシド注	72 mg/㎡	↓	↓	↓	↓																								
	ドキソルビシン塩酸塩注	14.4 mg/㎡	↓	↓	↓	↓																								
	オンコビン注	0.4 mg/㎡	↓	↓	↓	↓																								
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓	↓	↓	↓																								
	時間：24時間																													
	投与時、遮光してください																													

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-6014**

レジメン名：**DA-EPOCH-R（レベル3）**　　承 認 日：**2023/02/03**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
5	点滴静注 - メイン																													
	エンドキサン注	1080 mg/㎡					↓																							
	生理食塩液 500mL	1 本/body					↓																							
	時間：2時間																													
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body					↓																							
	速度：全開で																													

投与時の注意：
※G-CSF：day6よりnadirを超えてANC>5000/μlまで投与。

※nadirのANCが500/μl未満になるようにVP-16,DXR,CPA投与量を20%増減する。
（投与量設定規定に従う）

EBM：
haematologica 2020;vol105 No.9:2308-2315

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(抗がん剤)：
プレドニン錠60mg/㎡内服　day1-5　適宜増減

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
アセトアミノフェン　400mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
レスタミン　30mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
ST合剤　4g/日　p.o.　週3回
PPI・H2拮抗剤　p.o.　day1から