レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**その他(血液内科)**　　申請医師:

コード：**B-6017**

レジメン名：**A+CHP**　　承 認 日：**2023/04/06**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	アドセトリス点滴静注用50mg	1.8 mg/kg	↓																											
	生理食塩液注 100mL	100 mL/body	↓																											
	時間：30分																													
	アドセトリス上限値：180mg/body																													
	1Vあたり注射用水10.5mlで溶解する																													
	体重85kg未満の場合、生食100mlで希釈。																													
	体重85kg以上の場合、生食250mlで希釈。																													
3	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													
4	点滴静注 - メイン																													
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body	↓																											
	速度：全開で																													
5	点滴静注 - メイン																													
	ドキソルビシン塩酸塩注	50 mg/㎡	↓																											
	生理食塩液注 100mL	100 mL/body	↓																											
	時間：30分																													

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**その他(血液内科)**　　申請医師:

コード：**B-6017**

レジメン名：**A+CHP**　　承 認 日：**2023/04/06**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
6	点滴静注 - メイン																													
	エンドキサン注 500mg ●	750 mg/㎡	↓																											
	生理食塩液 500mL	500 mL/body	↓																											
	時間：2時間																													
7	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													

EBM：

Horwitz S,et al:Blentuximab vedotin with chemotherapy for CD30-positive peripheral T-cell lymphoma(ECHELON-2):a global,double-blind,randomised,phase 3 trial.
Lancet.2019,393(10168):229-240
ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ：添付文書、IF、適正使用ガイド

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(抗がん剤)：

プレドニン錠 60mg/㎡ 内服 day1-5 適宜増減

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：

アセトアミノフェン 400mg p.o.　アドセトリス点滴30分前
レスタミン　30mg p.o.　アドセトリス点滴30分前

その他：

※状況に応じてG-CSF製剤の一次予防的投与を検討する。
最大8コースまで