

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：その他(血液内科)

申請医師：

コード：B-6018

レジメン名：【皮下注】D-CyBorD療法【1-2コース目】

承認日：2023/09/13

1コース：28日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	皮下注射 - なし																													
	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	↓							↓							↓							↓						
	チューブ付き翼状針使用し約3-5分かけて投与。																													
	20mLシリンジに全量(15ml+α)採取。*チューブ内の口																													
	ス分を補うため																													
	シリンジで交付																													
2	皮下注射 - なし																													
	ベルケイド注	1.3 mg/m ²	↓							↓							↓							↓						
	生理食塩液注 20mL	1.2 mL/body	↓							↓							↓							↓						
	3mgあたり生食1.2mlで溶解																													
	シリンジで交付																													

中止基準：

- <シクロフォスファミド投与基準>
- ①NEUT>1500, PLT>10万 100%
- ②NEUT 1000-1500, PLT 5万-10万 50%
- ③NEUT<1000 or PLT<5万 休薬

投与時の注意：

デキサメタゾン70歳超、低体重 (BMI ≤ 18.5kg/m²)、循環血液量過多 (心不全を含む)、コントロール不良の糖尿病、過去のステロイド療法不耐の場合、day2, 9, 16, 23のデキサメタゾン20mg/bodyを省略し、20mg/weekへの減量可能。

EBM：

Palladini G, Kastritis E, Maurer MS, et al.
 Daratumumab plus CyBorD for patients with newly diagnosed AL amyloidosis: safety run-in results of ANDROMEDA. Blood. 2020;136:71-80
 NCCNガイドライン2022
 ダラキューロ適正使用ガイド

レジメン登録内容

2 / 2

診療科：血液内科

対象疾患：その他(血液内科)

申請医師：

コード：B-6018

承認日：2023/09/13

レジメン名：【皮下注】D-CyBorD療法【1-2コース目】

1コース：28日間 標準コース数：1回

レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：

- ・シクロfosファミド 300mg/m² Day1, 8, 15, 22
(上限500mg/body)
- ・デキサメタゾンp.o. 20mg/day Day1-2, 8-9, 15-16, 22-23
ダラキユーロ投与1時間前に服用(ダラキユーロ投与日に限り)

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

- アセトアミノフェン400mg, レスタミン30mg p.o. Day1, 8, 15, 22
(デキサメタゾン錠と同時に服用)
(ダラキユーロ投与1時間前に服用)