

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：非ホジキンリンパ腫

申請医師：

レジメン名：Epcoritamab[1コース目]

コード：B-6020

承認日：2024/03/08

1コース： 28日間 標準コース数： 1 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	皮下注射 - メイン																													
	エプキンリ皮下注	0.16 mg/body	↓																											
	生理食塩液注 20mL	1 V/body	↓																											
	※支持薬服用後30-120分後に投与																													
	※シリンジで交付。																													
2	皮下注射 - メイン																													
	エプキンリ皮下注	0.8 mg/body								↓																				
	生理食塩液注 20mL	1 V/body								↓																				
	※支持薬服用後30-120分後に投与																													
	※シリンジで交付。																													
3	皮下注射 - メイン																													
	エプキンリ皮下注	48 mg/body																↓						↓						
	生理食塩液注 20mL	1 V/body																↓						↓						
	※支持薬服用後30-120分後に投与																													
	※シリンジで交付																													

EBM：

Thieblemont C, et al: Epcoritamab, a Novel, Subcutaneous CD3xCD20 Bispecific T-Cell-Engaging Antibody, in Relapsed or Refractory Large B-Cell Lymphoma: Dose Expansion in a Phase I/II Trial. J Clin Oncol. 2023. 41(12):2238-2247

Hutchings M, et al.: Dose escalation of subcutaneous epcoritamab in patients with relapsed or refractory B-Cell non-Hodgkin lymphoma: an open-label, phase 1/2 study. Lancet. 2021. 398(10306):1157-1169

エプキンリ皮下注添付文書、適正使用ガイド

レジメン登録内容

2 / 2

診療科：血液内科

対象疾患：非ホジキンリンパ腫

申請医師：

コード：B-6020

承認日：2024/03/08

レジメン名：Epcoritamab[1コース目]

1コース：28日間 標準コース数：1回

レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：

day1-4, 8-11, 15-18, 22-25

プレドニゾン 100mg/day

(day1, 8, 15, 22 エプキンリ投与30~120分前)

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

day1, 8, 15, 22 エプキンリ投与30~120分前

アセトアミノフェン 1000mg p. o.

レスタミン 50mg p. o.