レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**中枢神経リンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-8001**

レジメン名：**R-MPV**　　承 認 日：**2021/05/31**

1コース：　**14** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	カテーテル挿入中心静 - メイン															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓													
	速度：全開で															
2	カテーテル挿入中心静 - メイン															
	リツキサン注	375 mg/㎡	↓													
	生理食塩液 500mL	500 mL/body	↓													
	※　初回：25mL/hから開始。1時間毎に100mL/h、200mL															
	/hに増量。															
	※　2回目以降：問題なければ100mL/hから開始。1時間															
	後200mL/hに増量。															
3	カテーテル挿入中心静 - メイン															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓													
	速度：全開で															
	リツキサン投与終了後															
4	カテーテル挿入中心静 - メイン															
	メイロン注 7%20mL　●	6 A/body		↓	↓	↓	↓									
	ソルデム 3A 500mL(ｿﾘﾀT3 GE)	6 本/body		↓	↓	↓	↓									
	時間：24時間															
5	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body		↓												
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 V/body		↓												
	速度：全開で															

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**中枢神経リンパ腫**　　申請医師:

コード：B-8001

レジメン名：R-MPV　　承 認 日：2021/05/31

1コース：　14日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	オンコビン注	1.4 mg/㎡		↓												
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		↓												
	速度：全開で															
	オンコビン上限値：2mg/body															
7	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	メソトレキセート注	3500 mg/㎡		↓												
	生理食塩液 500mL	300 mL/body		↓												
	時間：3時間															
	上限値：3500mg/㎡															
8	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		↓												
	速度：全開で															
9	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 V/body			↓	↓										
	生理食塩液注 50mL	1 本/body			↓	↓										
	速度：全開で															
10	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	ロイコボリン注 3mg/1mL	24 mg/body			↓											
	生理食塩液注 50mL	1 本/body			↓											
	時間：15分															
	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与開始から24時間後に開始し6時間毎に投与															

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**中枢神経リンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-8001**

レジメン名：**R-MPV**　　承 認 日：**2021/05/31**

1コース：　**14** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	ロイコボリン注 3mg/1mL	24 mg/body			↓	↓	↓									
	生理食塩液注 50mL	1 本/body			↓	↓	↓									
	時間：15分															
	前回ロイコボリン投与から6時間後に投与															
	医師が中止と判断するまで継続															
12	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	ロイコボリン注 3mg/1mL	24 mg/body			↓	↓	↓									
	生理食塩液注 50mL	1 本/body			↓	↓	↓									
	時間：15分															
	前回ロイコボリン投与から6時間後に投与															
	医師が中止と判断するまで継続															
13	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	ロイコボリン注 3mg/1mL	24 mg/body				↓	↓									
	生理食塩液注 50mL	1 本/body				↓	↓									
	時間：15分															
	前回ロイコボリン投与から6時間後に投与															
	医師が中止と判断するまで継続															

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**中枢神経リンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-8001**

レジメン名：**R-MPV**　　承 認 日：**2021/05/31**

１コース：　**14** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	カテーテル挿入中心静 - 側管															
	ロイコボリン注 3mg/1mL	24 mg/body				↓	↓									
	生理食塩液注 50mL	1 本/body				↓	↓									
	時間：15分															
	前回ロイコボリン投与から6時間後に投与															
	医師が中止と判断するまで継続															

中止基準：
MTXはCCr46～60mL/min：65%に減量　31～45mL/min:50%に減量
血清ビリルビン3.1～5.0mg/dL　またはAST>180IU/Lのとき75%に減量
70歳以上でも減量を考慮

投与時の注意：
フロセミド、バクタ、NSAIDｓは原則併用禁
ルートはCV確保、リツキサンとMTX投与中はECGモニター

MTX基準濃度：投与開始48hr後<１μM、72hr後<0.1μMを目安に濃度が高ければ下がるまでロイコボリン増量し継続。投与開始後48hrで0.5μMを下回っていたら72hr後まででロイコボリンは終了も可。

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(抗がん剤)：
塩酸プロカルバジンCap 50mg　3Cap/日　毎食後（Day2-8）奇数サイクルのみ服用

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
アセトアミノフェン　400mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
レスタミン　30mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
ダイアモックス 250mg　2錠分2朝夕内服（Day2-5）

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**中枢神経リンパ腫**

申請医師:
コード：**B-8001**
承 認 日：**2021/05/31**

レジメン名：**R-MPV**

1コース：　**14** 日間　　標準コース数：　**1**　回

その他：
ロイコボリンは最低8回投与、血中濃度を見て投与延期・24mg～51mgまで増量可。
2回目以降の場合は、前回投与時の血中濃度を参考の上投与量と期間を検討。