レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**　　申請医師:

コード：L-1006

レジメン名：CBDCA/PTX　　承 認 日：2007/01/15

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	点滴静注 - メイン																						
	アロカリス点滴静注235mg/10mL	1 瓶/body	↓																				
	時間：30分																						
	RP2に混合																						
2	点滴静注（詳細指定な - メイン																						
	ファモチジン注射用20mg	1 A/body	↓																				
	ポララミン注 5mg/1mL	1 A/body	↓																				
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	2 V/body	↓																				
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL●	2 A/body	↓																				
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body	↓																				
	時間：30分																						
	RP2内にRP1アロカリスを混合																						
3	点滴静注 - メイン																						
	生理食塩液注 100mL	100 mL/body	↓																				
	時間：30分																						
4	点滴静注 - メイン																						
	パクリタキセル注	210 mg/㎡	↓																				
	5%ブドウ糖注 500mL ●	500 mL/body	↓																				
	時間：3時間																						
	パクリタキセル上限値：220mg/㎡																						
	投与時、フィルターを使用してください																						

レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**　　申請医師:

コード：L-1006

レジメン名：CBDCA/PTX　　承 認 日：2007/01/15

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
5	点滴静注 - メイン																													
	カルボプラチン点滴静液	6 AUC/body	↓																											
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓																											
	時間：1時間																													
6	点滴静注（詳細指定な - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	50 mL/body	↓																											
	速度：全開で																													

その他：
2023/6/14 アプレピタント125mg→アロカリスへ変更
重篤な副作用の主な発現状況(Grade3以上)
好中球減少84.5%、血小板減少8.6%、発熱性好中球減少症6.9%、食欲不振1.7%
＊臨床試験データに基づく