

レジメン登録内容

診療科：乳腺外科

対象疾患：乳がん

申請医師：

レジメン名：ケリサルCMF

コード：M-1014

承認日：2014/05/23

1コース： 28日間 標準コース数： 1 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	点滴静注 - メイン																													
	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50ml 「タイホ	1 袋/body	↓							↓																				
	デキサート注射液6.6mg/2mL ●	1 V/body	↓							↓																				
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	メソトレキセート注	40 mg/m ²	↓							↓																				
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	↓							↓																				
	速度：全開で																													
3	点滴静注 - メイン																													
	5FU注	600 mg/m ²	↓							↓																				
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	↓							↓																				
	速度：全開で																													
4	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	50 mL/body	↓							↓																				
	速度：全開で																													

投与時の注意：

※60歳以上：MTX 30mg/m²、5FU 400mg/m²

※骨髄抑制、肝・腎機能障害などの重篤副作用→中止・減量

レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：

エンドキサン錠 100mg/m² 分1朝食後 day1-14 (BSA1.5m²未満は2錠、1.5m²以上は3錠)

(MTX添付文書上は CPA 65mg/m²/day)

レジメン登録内容

2 / 2

診療科：乳腺外科

対象疾患：乳がん

申請医師：

コード：M-1014

承認日：2014/05/23

レジメン名：クラシカルCMF

1コース： 28日間 標準コース数： 1 回

その他：

文献、乳癌治療ガイドラインの用量で作成
MTX添付文書上は 5FU 500mg/m²、CPA p.o. 65mg/m²/day day1-14)

2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更

重篤な副作用の主な発現状況 (Grade3以上)
顆粒球減少17%、下痢3%、感染3%、悪心3%
* 臨床試験データに基づく