

レジメン登録内容

診療科：乳腺外科

対象疾患：乳がん

申請医師：

コード：M-1071

レジメン名：3W DOC60+HER+PER(初回)

承認日：2014/10/24

1コース：21日間

標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																		
1	点滴静注 - メイン																																								
	デキサート注射液 6.6mg/2mL ●	1 V/body	↓																																						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																																						
	速度：全開で																																								
2	点滴静注 - メイン																																								
	ドセタキセル点滴静注「ニフロ」	60 mg/m ²	↓																																						
	5%ブドウ糖注 250mL ●	250 mL/body	↓																																						
	時間：1時間30分																																								
3	点滴静注 - メイン																																								
	パージェタ点滴静注	840 mg/body	↓																																						
	生理食塩液 250mL	1 本/body	↓																																						
	時間：1時間																																								
4	点滴静注 - メイン																																								
	トラスツズマブ注	8 mg/kg	↓																																						
	生理食塩液 250mL	1 本/body	↓																																						
	時間：1時間30分																																								
5	点滴静注 - メイン																																								
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																																						
	速度：全開で																																								

EBM：

- N ENGI J Med 366:109, 2012
- Lancet Oncol 14:461, 2013
- J Clin Oncol 2006. 24(31):4963-4969

レジメン登録内容

2 / 2

診療科：乳腺外科

対象疾患：乳がん

申請医師：

コード：M-1071

承認日：2014/10/24

レジメン名：3W DOC60+HER+PER(初回)

1コース：21日間 標準コース数：1回

その他：

2020/2/1 ドセタキセル(ワタキGE)→ドセタキセル「コプロ」に変更 レジメン名称・番号変更
2021/3/17 ハセプチン注→トラスツマブ注「第一三共」へ変更

重篤な副作用の主な発現状況(Grade3以上)

下痢66.8%、脱毛60.9%、好中球減少52.8%、悪心42.3%、疲労37.6%

* 臨床試験データに基づく