レジメン登録内容

診療科：**乳腺外科**　　対象疾患：**乳がん**

申請医師:
コード：**M-1084**
承 認 日：**2022/10/14**

レジメン名：**3wPemb+EC90**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	キイトルーダ注	200 mg/body	↓																											
	生理食塩液注 100mL	1 本/body	↓																											
	時間：30分																													
	投与時、フィルターを使用してください。																													
3	点滴静注 - メイン																													
	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50ml 「ﾀｲﾎｳ	1 袋/body	↓																											
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 Ｖ/body	↓																											
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL●	2 Ａ/body	↓																											
	速度：全開で																													
4	点滴静注 - メイン																													
	エピルビシン注	90 mg/㎡	↓																											
	生理食塩液注 50mL	50 mL/body	↓																											
	速度：全開で																													
5	点滴静注 - メイン																													
	エンドキサン注	600 mg/㎡	↓																											
	生理食塩液 250mL	250 mL/body	↓																											
	時間：1時間																													

レジメン登録内容

診療科：**乳腺外科**　　対象疾患：**乳がん**

申請医師:
コード：**M-1084**
承 認 日：**2022/10/14**

レジメン名：**3wPemb+EC90**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	50 mL/body	↓																											
	速度：全開で																													

投与時の注意：
術前に4コース実施

EBM：
Pembrolizumab for Early Triple-Negative Breast Cancer.
NEJM. 2020,382:810-821
Event-free survival with Pembrolizumab in Early Triple-Negative Breast Cancer.
NEJM. 2022,386:556-567(KEYNOTE-522)

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
アプレピタント125mg(day1),アプレピタント80mg(day2,3)
デカドロン8mg/day(day2-4)