



# レジメン登録内容

診療科：腫瘍内科

対象疾患：胃がん

申請医師：

コード：0-2001

レジメン名：S-1/CDDP (SP)

承認日：2007/01/15

1コース：28日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6	点滴静注 - メイン																													
	プリンペラン注 10mg/2mL	2 A/body									↓																			
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 V/body									↓																			
	生理食塩液注 100mL	1 本/body									↓																			
	時間：30分																													
7	点滴静注 - メイン																													
	ソルデム 3A 500mL (ソリタ3 GE)	2 本/body									↓																			
	アクメインD輸液 500mL (ヴァインD GE)	2 袋/body									↓																			
	時間：24時間																													
8	点滴静注 - なし																													
	ノバミン注 5mg/1mL	1 A/body									↓																			
	生理食塩液注 50mL	1 本/body									↓																			
	頓用 嘔気のある時 day8~12 3回分																													
9	静脈内注射 - 側管																													
	ラシックス注 20mg/2mL	1 A/body									↓																			
	頓用 医師の指示通り day8~12 3回分																													
	投与経路確保																													

レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：

ティーエスワン day1-21

体表面積1.25㎡未満：80mg/日、1.25-1.5㎡未満：100mg/日、1.5㎡以上：120mg/日

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アプレピタント125mg(day8)、80mg(day9,10)

## レジメン登録内容

3 / 3

診療科：腫瘍内科

対象疾患：胃がん

申請医師：

コード：0-2001

承認日：2007/01/15

レジメン名：S-1/CDDP (SP)

1コース：28日間 標準コース数：1回

### その他：

2010/8/24名称変更 (旧名称：TS-1/CDDP、S-1/CDDP)  
2016/7/26 CDDP輸液量変更：生食500mL→300mL  
2019/10/25 名称変更 TS-1/CDDP (SP) → S-1/CDDP (SP)  
2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更

重篤な副作用の主な発現状況 (Grade3以上)

好中球減少40%、食欲不振30%、貧血26%、白血球減少11%、血小板減少5%

\* 臨床試験データに基づく