レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**胃がん**

申請医師:

コード：**0-2029**

レジメン名：**XP[short(外来用)]+HER(初回)**

承 認 日：**2014/07/25**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	点滴静注 - メイン																													
	トラスツズマブ注	8 mg/kg	↓																											
	生理食塩液 250mL	1 本/body	↓																											
	時間：90分																													
2	点滴静注 - メイン																													
	硫酸Mg 補正液1mEq/ml (20mL)	4 mL/body	↓																											
	KCL注20mEqキット(ﾃﾙﾓ) (要希釈)	0.5 本/body	↓																											
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓																											
	時間：1時間																													
3	点滴静注 - メイン																													
	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50ml 「ﾀｲﾎｳ	1 袋/body	↓																											
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 Ｖ/body	↓																											
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL●	2 Ａ/body	↓																											
	速度：全開で																													
4	点滴静注 - メイン																													
	シスプラチン注	80 mg/㎡	↓																											
	生理食塩液 500mL	300 mL/body	↓																											
	時間：1時間																													
5	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓																											
	硫酸Mg 補正液1mEq/ml (20mL)	4 mL/body	↓																											
	KCL注20mEqキット(ﾃﾙﾓ) (要希釈)	0.5 本/body	↓																											
	時間：1時間																													

レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**胃がん**

申請医師:
コード：**0-2029**
承 認 日：**2014/07/25**

レジメン名：**XP[short(外来用)]+HER(初回)**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
6	点滴静注 - なし																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	プライミング用（最初にルート内を満たすために使用																													
	する）																													

EBM：
ToGA試験、ハーセプチン添付文書
NCCN templates Gastric Cancer Cisplatin/capecitabine. http://www.nccn.org/ordertemplates/default.asp

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(抗がん剤)：
ゼローダ　2000mg/㎡/day,　day1-14

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
アプレピタント125mg(day1)、80mg(day2,3)

その他：
初回は必ず入院で行い、忍容性を確認の上で外来へ移行する。
day1～4まで毎朝体重測定。尿測は不要。day1を基準に体重が1.5kg以上増加時、ラシックス(40mg)1錠内服(朝食後)。
2019.5.30　ハーセプチン→トラスツズマブに変更
2022/4/25　アロキシ→パロノセトロンに変更

重篤な副作用の主な発現状況(Grade3以上)
好中球減少35%、貧血25%、食欲不振24%、悪心14%、発熱性好中球減少10%
＊臨床試験データに基づく