

レジメン登録内容

診療科：腫瘍内科

対象疾患：大腸がん

申請医師：

コード：0-3027

レジメン名：SIR+BV (SIRB)

承認日：2010/02/26

1コース：21日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
1	点滴静注 - メイン																																		
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body	↓																																
	デキサート注射液6.6mg/2mL ●	1 V/body	↓																																
	速度：全開で																																		
2	点滴静注 - メイン																																		
	ペバシズマブ点滴静注	7.5 mg/kg	↓																																
	生理食塩液注 100mL	1 本/body	↓																																
	時間：30分																																		
	ペバシズマブ上限値：10mg/kg																																		
3	点滴静注 - メイン																																		
	カンプト注	150 mg/m ²	↓																																
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓																																
	時間：1時間30分																																		
	カンプト上限値：180mg/m ²																																		
4	点滴静注 - メイン																																		
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																																
	速度：全開で																																		

レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：

ティーエスワン day1-14 体表面積1.25m²未満:80mg/日、1.25-1.5m²未満:100mg/日、1.5m²以上:120mg/日

レジメン登録内容

2 / 2

診療科：腫瘍内科

対象疾患：大腸がん

申請医師：

コード：0-3027

承認日：2010/02/26

レジメン名：SIR+BV (SIRB)

1コース：21日間 標準コース数：1回

その他：

2022/5/30 アバスチン→ベバシズマブに変更

重篤な副作用の主な発現状況(Grade3以上)

好中球減少24.3%、高血圧8.4%、食欲不振6.7%、貧血5%、倦怠感3.8%

* 臨床試験データに基づく