# レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**大腸がん**

申請医師:
コード：0-3036
承 認 日：2013/09/20

レジメン名：sLV5FU2+P-mab

1コース：14日間　　標準コース数：1　回

| Rp | 処方 | DOSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL | 1 Bag/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサート注射液6.6mg/2mL● | 1 V/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 速度：全開で | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベクティビックス点滴静注 | 6 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 100mL | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：15分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投与時、フィルターを使用してください | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | レボホリナート注 | 200 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖注 250mL ● | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：2時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5FU注 | 400 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 50mL | 30 mL/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 速度：全開で | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 50mL | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 速度：全開で | | | | | | | | | | | | | | | |

# レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**大腸がん**

申請医師:
コード：**0-3036**
承 認 日：**2013/09/20**

レジメン名：**sLV5FU2+P-mab**

１コース：　**14** 日間　　標準コース数：　**1**　回

| Rp | 処方 | DOSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5FU注 | 2400 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 20mL | 40 mL/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：46時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5FU上限値：3000mg/㎡,　トレフューザー | | | | | | | | | | | | | | | |

その他：
５FUポンプの生食充填容量はポンプ換算表に従う。

2017/3/23　シュアヒューザーA　→　トレフューザー　に変更
2017/4/28　抗がん剤投与後の生食50ml全開投与を追加