# レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**大腸がん**

申請医師:
コード：0-3044
承 認 日：2016/05/27

レジメン名：FOLFOXIRI+BV

1コース：　14日間　　標準コース数：　1　回

| Rp | 処方 | DOSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50ml「ﾀｲﾎｳ | 1 袋/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサート注射液6.6mg/2mL● | 1 Ｖ/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 速度：全開で | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ点滴静注 | 5 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 100mL | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：30分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カンプト注 | 165 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖注 250mL ● | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：1時間30分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 － メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エルプラット点滴静注 | 85 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖注 250mL ● | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：2時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 － 側管 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | レボホリナート注 | 200 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖注 250mL ● | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：2時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rp4 エルプラットと同時に開始 | | | | | | | | | | | | | | | |

# レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**大腸がん**

申請医師:
コード：0-3044
承 認 日：2016/05/27

レジメン名：FOLFOXIRI+BV

1コース：　14 日間　　標準コース数：　1　回

| Rp | 処方 | DOSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 50mL | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 速度：全開で | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5FU注 | 3200 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 20mL | 20 mL/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：48時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トレフューザー | | | | | | | | | | | | | | | |

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
　アプレピタント125mg(day1)、80mg(day2,3)

その他：
　５FUポンプの生食充填容量はポンプ換算表に従う。

2017/3/23　シュアヒューザーA【大】　→　トレフューザー　に変更
2017/4/28　抗がん剤投与後の生食50ml全開投与を追加
2020/08/20 イメンド→アプレピタントに変更
2022/4/25　アロキシ→パロノセトロンに変更
2022/5/30　アバスチン→ベバシズマブに変更

重篤な副作用の主な発現状況(Grade3以上)
好中球減少50%、下痢18.8%、発熱性好中球減少症8.8%、口内炎8.8%、静脈血栓塞栓症7.2%
＊臨床試験データに基づく