

レジメン登録内容

診療科：腫瘍内科

対象疾患：肝胆膵がん

申請医師：

レジメン名：FOLFIRINOX

コード：0-4007

承認日：2013/11/22

1コース： 14日間 標準コース数： 1 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																
6	点滴静注 - メイン																															
	5FU注	400 mg/m ²	↓																													
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	↓																													
	速度：全開で																															
7	点滴静注 - メイン																															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																													
	速度：全開で																															
8	点滴静注 - メイン																															
	5FU注	2400 mg/m ²	↓																													
	生理食塩液注 20mL	40 mL/body	↓																													
	時間：46時間																															
	トレフェューザー																															

EBM：
NEJM 2011, 1817-25
J Clin Oncol 2013, 23-9

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：
アプレピタント125mg(day1)、80mg(day2,3)

レジメン登録内容

3 / 3

診療科：腫瘍内科

対象疾患：肝胆膵がん

申請医師：

コード： 0-4007

承認日： 2013/11/22

レジメン名： FOLFIRINOX

1コース： 14日間 標準コース数： 1 回

その他：

原法はCPT-11 180mg/m²から開始

5FUポンプの生食充填容量はポンプ換算表に従う。

2017/3/23 シュアヒューザーA → トレフューザー に変更

2017/4/28 抗がん剤投与後の生食50ml全開投与を追加

2020/08/20 イメンド→アプレピタントに変更

2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更

重篤な副作用の主な発現状況 (Grade3以上)

好中球減少45.7%、疲労23.6%、嘔吐14.5%、下痢12.7%、悪心12.0%

* 臨床試験データに基づく