

レジメン登録内容

診療科：婦人科

対象疾患：卵巣がん

申請医師：

コード：Y-1023

レジメン名：PLD+BV

承認日：2014/01/24

1コース：28日間 標準コース数：1回

| Rp | 処方 | DOSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサート注射液6.6mg/2mL● | 1 V/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 50mL | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ドキシル注 | 40 mg/m ² | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖注 250mL ● | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：1時間30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フィルター使用禁止。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投与量90mg未満の場合、5%ブドウ糖液250mLで希釈。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投与量90mg以上の場合、5%ブドウ糖液500mLで希釈。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドキシル上限値：50mg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ペバシマブ点滴静注 | 15 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 100mL | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：90分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 初回は90分で投与、問題なければ2回目60分、3回目以降30分で投与。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 50mL | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 速度：全開で | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与時の注意：

ドキシル：投与速度は1mg/分を超えないこと。輸液ポンプ使用

レジメン登録内容

2 / 2

診療科：婦人科

対象疾患：卵巣がん

申請医師：

コード：Y-1023

承認日：2014/01/24

レジメン名：PLD+BV

1コース：28日間 標準コース数：1回

EBM：

J Clin Oncol 30:2039-2045, 2012
N Eng J Med 365:2473-2483 2011
N Eng J Med 365:2484-2496 2011
ASCO 2012 Abstract:AURELIA

その他：

2016/7/25 DOXIL+BV→Doxil+BVにレジメン名称変更
2017/6/23 ドキシル50mg/m²→40-50mg/m²に変更
2023/9/28 アバスチン→ペバシズマブへ変更