

レジメン登録内容

診療科：婦人科

対象疾患：卵巣がん

申請医師：

コード：Y-1028

レジメン名：PLD/CBDCA

承認日：2019/02/22

1コース：28日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	点滴静注 - メイン																													
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL ●	2 A/body	↓																											
	パロノセトロン点滴静注パック0.75mg/50ml 「タイホ	1 袋/body	↓																											
	アロカリス点滴静注235mg/10mL	1 瓶/body	↓																											
	時間：30分																													
2	点滴静注 - メイン																													
	ドキシル注	30 mg/m ²	↓																											
	5%ブドウ糖注 250mL ●	250 mL/body	↓																											
		時間：1時間																												
	フィルター使用不可																													
3	点滴静注 - メイン																													
	カルボプラチン点滴静液	5 AUC/body	↓																											
	5%ブドウ糖注 250mL ●	250 mL/body	↓																											
		時間：1時間																												
	カルボプラチン上限値：750mg/body																													
4	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	50 mL/body	↓																											
		速度：全開で																												

中止基準：

本剤を投与後、LVEF値が45%を下回った場合、投与中止。
 投与前LVEF値より20%以上の低下が認められた場合、投与中止。

投与時の注意：

ドキシルは累積投与量が多くなると心筋障害の副作用が出現しうる。LVEF値は初回投与前に行い、累積投与量が300mg/m²を超えた時点で実施し、400mg/m²を超えた場合には毎コース実施することが望ましい。

レジメン登録内容

2 / 2

診療科：婦人科

対象疾患：卵巣がん

申請医師：

コード：Y-1028

承認日：2019/02/22

レジメン名：PLD/CBDCA

1コース：28日間 標準コース数：1回

EBM：

JCO 2010 Vol28(20) p.3323-3329

その他：

2020/08/20 イメンド→アプレピタントに変更

2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更

2023/7/20 アプレピタント→アロカリスへ変更